

FUNGICIDA

QEMETICA[®]
Agricultural Solutions

Hicarb[®]

HIDRÓGENO CARBONATO DE SODIO 99%

Polvo Soluble (SP)



www.qemetica-agro.es

Hicarb®


Autorizado como sustancia básica de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento (CE) 1107/2009.

El hidrógeno carbonato de sodio aprobado como sustancia básica por el Reglamento de ejecución (UE) 2015/2069.




Formato
5 Kg

¿Qué es?


Hicarb® es un producto con acción biofungicida para el control de oídio y moteado, formulado como polvo mojable (SP) y con un doble modo de acción preventivo y curativo.

¿Cómo funciona?

COMBINA EL EFECTO ERRADICANTE CON LA SUPRESIÓN DE LA INFECCIÓN DEL HONGO: El modo de acción interviene alterando el PH y la presión osmótica en el patógeno. Inhibe el desarrollo de las hifas y esporas. Actúa por contacto mediante un efecto físico en la membrana del hongo hasta su destrucción.



pH alcalino en el medio




Plasmólisis y muerte de la célula del hongo

¿Por qué elegirlo?

-  **CURATIVO:** Deshidrata rápidamente al hongo. Tiene un efecto físico en el que rompe la membrana celular del hongo por presión ósmótica, haciendo que su tubo germinativo no sea viable y por tanto su reproducción.
-  **PREVENTIVO:** Altera el PH del medio de la superficie de la hoja, convirtiéndolo en un lugar muy desfavorable para la germinación de las esporas del hongo. Es un producto muy adecuado para incluirlo en un programa de tratamientos, junto con otros fungicidas, con el objetivo de realizar un buen manejo de resistencias.

¿Cuándo aplicar?

PERMITE UN AMPLIO RANGO DE APLICACIÓN Y ES UNA HERRAMIENTA IDEAL EN LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS (GIP)



CULTIVOS	AGENTE	DOSIS (G/HL)	VOLUMEN DE CALDO (L/HA)	MOMENTO DE APLICACIÓN
 Manzano	Moteado (<i>Venturia inaequalis</i>)	500 - 1000 (Máx. 5 kg/ha)*	500 - 1000	BBCH 10-85
 Vid (vinificación y mesa)	Oídio de la vid (<i>Uncinula necator</i>)	420 - 2000 (Máx. 5 kg/ha)*	200 - 600	BBCH 12-89
 Hortícolas (aire libre/invernadero)	Oídio (<i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Oidio</i> spp.)	333 - 1000 (Máx. 5 kg/ha)**	300 - 600	BBCH 12-89
 Fresas (aire libre/invernadero)				
 Moras, frambuesas, arándanos, grosellas y otras bayas y frutos pequeños (aire libre/invernadero)				
 Ornamentales (aire libre/invernadero)				

* Los volúmenes de caldo y dosis de aplicación variarán en función del tamaño de la copa del árbol. Concentraciones superiores a 1-2% pueden ser fitotóxicas.
** Los diferentes cultivos tienen diferente sensibilidad. Comprobar las concentraciones para efectos fitotóxicos antes de utilizar el producto ampliamente sobre todo el cultivo.
Plazo de seguridad: 1 día en todos los cultivos.



QEMETICA
Agricultural Solutions Spain S.L.U.

C/ Valle del Roncal 12, 1a planta, oficina 7.
28232 Las Rozas, Madrid, España. Tel. +34 91 626 60 97.

Síguenos en:    

Visítanos en : www.qemetica-agro.es